

Hyperventilation

zu treffende Maßnahmen

- Patienten beruhigen, wenn möglich aus der Stresssituation herauslösen
- Wenn organische Ursachen ausgeschlossen: Rückatmung in Tüte (vorausgesetzt die Angst des Patienten wird dadurch nicht verstärkt)
- Eine Einlieferung in ein Krankenhaus ist nicht zwingend erforderlich nachdem der Zustand wieder normal ist.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Symptome

- Luftnot, Erstickungsangst, obwohl Sauerstoffsättigung des Blutes normal
- deutlich erhöhte Atemfrequenz (normal in Ruhe 16/Minute)
- beschleunigter Herzschlag
- bei voller Ausprägung:
 - Kribbeln in Mund, Nase und Händen
 - Pfötchenstellung

Ursachen

- Angst
- Erregungszustände
- emotional belastende Situationen
- Schmerzen

Quellenangabe

- [Erste-Hilfe kompakt - Notfallstichwort: Hyperventilation](#), Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes, Deutscher Feuerwehrverband

From:
<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/> - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:
https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=erste_hilfe:hyperventilation

Last update: **27.12.2014 21:46**

